


# MATHS



## CHAPITRE 6

## 1. Lecture sur le cercle trigonométrique




### 1. Le cercle trigonométrique

#### Définition

Dans un repère orthonormé  $(O; I, J)$ , le cercle de centre  $O$  et de rayon 1 parcouru de  $I$  vers  $J$  dans le sens inverse des aiguilles d'une montre est appelé le **cercle trigonométrique**.

On note  $I$  le point de coordonnées  $(1; 0)$ , et  $J$  le point de coordonnées  $(0; 1)$ , ainsi que  $I'$  et  $J'$  les symétriques respectifs de  $I$  et  $J$  par rapport à  $O$ .




### 2. Longueur d'un arc

#### Propriété (admise)

Sur le cercle trigonométrique, la longueur de l'arc de cercle  $\widehat{IM}$  (exprimée dans l'unité de longueur du repère) est proportionnelle à la mesure de l'angle  $\widehat{IOM}$  exprimée en degré.

Mesure de $\widehat{IOM}$ en degré	360	180	90	270
Longueur de l'arc $\widehat{IM}$	$2\pi$	$\pi$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$




### 3. Radian

#### Définition

Soit  $U$  le point du cercle trigonométrique tel que l'arc  $\widehat{IU}$  ait pour longueur 1 unité (exprimée dans l'unité de longueur du repère).

On définit un radian (noté 1 rad) comme étant la mesure de l'angle  $\widehat{IOU}$ .



#### Propriété (admise)

Les mesures d'un angle en degré, d'une part, et en radian, d'autre part, sont proportionnelles. On en déduit le tableau de conversion suivant.

$\times \frac{180}{\pi}$	Mesure en degré	30	45	60	90	180	1	$\frac{180}{\pi}$	$\times \frac{\pi}{180}$
	Mesure en radian	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\pi$	$\frac{\pi}{180}$	1	

#### Exemples

- L'arc  $\widehat{IJ}$  a pour longueur  $\frac{\pi}{2}$ . La mesure en degré de l'angle  $\widehat{IOJ}$  est égale à  $90^\circ$ . La mesure en radian de l'angle  $\widehat{IOJ}$  est égale à  $\frac{\pi}{2}$ .

## 2. Enroulement de la droite des réels

### 1. Point-image d'un réel

Dans un repère orthonormé  $(O; I, J)$ , on considère le cercle trigonométrique et la tangente  $\mathcal{D}$  au cercle au point  $I$ . On définit sur cette droite un repère d'origine / comme indiqué sur la figure ci-contre.

On imagine que la droite  $\mathcal{D}$  s'enroule autour du cercle.

#### Propriété (admise)


- Pour tout nombre réel  $\alpha$ , le point d'abscisse  $\alpha$  sur  $\mathcal{D}$  coïncide avec un unique point  $M$  du cercle trigonométrique.  $M$  s'appelle le **point-image** de  $\alpha$  sur le cercle trigonométrique.
- Réciproquement, à tout point  $M$  du cercle trigonométrique correspondent une infinité de valeurs qui peuvent être considérées comme les abscisses de points de la droite  $\mathcal{D}$ .

Si  $\alpha$  est l'abscisse d'un de ces points sur  $\mathcal{D}$ , tous les autres points de  $\mathcal{D}$  ont pour abscisses :

$$\alpha + 2\pi, \alpha + 4\pi, \dots, \alpha - 2\pi, \alpha - 4\pi, \dots$$

#### Exemples

- Soit  $\alpha = \pi$ . Comme le cercle trigonométrique est de rayon 1, son périmètre vaut  $2\pi$ . Le point-image de  $\pi$  sur le cercle trigonométrique est donc le point  $I'$ , point symétrique de  $I$  par rapport à  $O$ , car la longueur de l'arc  $\widehat{II'}$  est  $\pi$ .
- Au point  $J$  correspondent une infinité de valeurs qui sont les abscisses de la forme  $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + 2\pi, \frac{\pi}{2} + 4\pi, \dots, \frac{\pi}{2} - 2\pi, \frac{\pi}{2} - 4\pi, \dots$  de points de la droite  $\mathcal{D}$ .




### 2. Points-images remarquables du cercle trigonométrique

#### Propriété (admise)

Sur le cercle trigonométrique, les points  $I, A, B, C$  et  $J$  sont appelés points remarquables et sont définis par :

- $\widehat{IOI} = 2k\pi$ ,  $k$  entier relatif
- $\widehat{IOA} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ,  $k$  entier relatif
- $\widehat{IOB} = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ ,  $k$  entier relatif
- $\widehat{IOC} = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ,  $k$  entier relatif
- $\widehat{IOJ} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ,  $k$  entier relatif



## 3. Sinus et cosinus d'un nombre réel

### 1. Définitions


#### Définitions

Soit  $\alpha$  un nombre réel et soit  $M$  le point-image de  $\alpha$  sur le cercle trigonométrique. Dans le repère  $(O; I, J)$  :

- l'abscisse de  $M$  est appelée le **cosinus** de  $\alpha$ , noté  $\cos(\alpha)$  ;
- l'ordonnée de  $M$  est appelée le **sinus** de  $\alpha$ , noté  $\sin(\alpha)$  ;
- le point  $M$  a pour coordonnées  $M(\cos(\alpha); \sin(\alpha))$ .

#### Exemple

Le réel  $\frac{\pi}{2}$  a pour point-image  $J(0; 1)$ . Donc  $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$  et  $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ .



#### Propriétés

Pour tout réel  $\alpha$ , on a :


- $-1 \leq \cos(\alpha) \leq 1$  et  $-1 \leq \sin(\alpha) \leq 1$ .

- $\cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha) = 1$   
 $(\cos(\alpha))^2$  peut se noter  $\cos^2(\alpha)$ .

### 2. Valeurs remarquables du sinus et du cosinus

Certaines valeurs remarquables de  $\cos(\alpha)$  et  $\sin(\alpha)$  sont à connaître pour des valeurs de  $\alpha$  données. Elles correspondent à des positions remarquables du point  $M$  sur le cercle trigonométrique.

- $I$  est le point-image de 0.
- $M_1$  est le point-image de  $\frac{\pi}{6}$ .
- $M_2$  est le point-image de  $\frac{\pi}{4}$ .
- $M_3$  est le point-image de  $\frac{\pi}{3}$ .
- $J$  est le point-image de  $\frac{\pi}{2}$ .



$\alpha$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
Angle en degré	0	30	45	60	90
$\cos(\alpha)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin(\alpha)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1


### 3. Lien avec le sinus et le cosinus dans un triangle rectangle

On considère le cercle trigonométrique et la tangente  $\mathcal{D}$  au cercle.

Pour tout nombre  $\alpha \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right]$ , d'image  $M$ , on considère le point  $H$  de l'axe des abscisses tel que  $(MH)$  est perpendiculaire à  $(OI)$ .

On a :

- $\cos(\alpha) = \text{abscisse de } M = \frac{OH}{OM} = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}} = \cos(\widehat{HOM})$
- $\sin(\alpha) = \text{ordonnée de } M = \frac{HM}{OM} = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}} = \sin(\widehat{HOM})$







## 4. Fonctions sinus et cosinus

### 1. Définition

#### Définition

La **fonction sinus**, notée  $\sin$ , est la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $x \mapsto \sin(x)$ .  
 La **fonction cosinus**, notée  $\cos$ , est la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $x \mapsto \cos(x)$ .  
 Leurs courbes représentatives sont appelées des **sinusoïdes**.



#### Remarque

Pour tout  $x$  réel,  $-1 \leq \sin(x) \leq 1$  et  $-1 \leq \cos(x) \leq 1$ .



### 2. Périodicité et parité

#### Définition

Une fonction trigonométrique  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  est **périodique de période  $T$**  si et seulement si, pour tout réel  $x$ ,  $f(x + T) = f(x)$ .

#### Propriété


Pour tout  $x$  réel, on a  $\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$  et  $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$ .  
 On dit que les fonctions sinus et cosinus sont  $2\pi$  - périodiques.




#### Propriété

Pour tout  $x$  réel, on a :

- $\sin(-x) = -\sin(x)$  : on dit que la fonction sinus est impaire ;
- $\cos(-x) = \cos(x)$  : on dit que la fonction cosinus est paire.



La courbe de la fonction sinus est donc symétrique par rapport à 0.



La courbe de la fonction cosinus est donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.